

Til deg som skal få behandling med Ialuril (virkestoff kondroitinsulfat og hyaluronsyre).

Blæreslimhinnen er dekket av et beskyttende lag (glykosaminoglykan-laget eller GAG-laget). Kondroitinsulfat og hyaluronsyre er en naturlig bestanddel av dette laget. Ved skader på GAG-laget kan substanser fra urinen slippe gjennom laget og irritere urinblæren. Dette kan gi symptomer som sterk vannlatingstrang, hyppig vannlating eller smerter. Ved å skylle blæren regelmessig med Ialuril vil GAG-laget bli gjendannet.

Ialuril gis til pasienter som har smerter ved vannlating, hyppig vannlating og/eller tilbakevendende urinveisinfeksjoner.

Behandlingen er bestemt av lege og tilpasses individuelt.

Det er vanlig å starte 8 ukentlige behandlinger før evaluering av hvordan Ialuril virker. Hvis du ikke har noen effekt avsluttes behandlingen. Noen pasienter fortsetter med vedlikeholdsbehandlinger, dette bestemmes individuelt. Når behandlingen fortsetter over lengre tid får du opplæring i å sette dette på deg selv via engangskateterisering og følges opp med telefonkonsultasjon.

Selve blæreinstalleringen settes av sykepleier eller uroterapeut på urologisk poliklinikk og du kan møte på flere av oss i løpet perioden du går til behandling.

Væsken, 50 ml, med virkestoffet settes inn gjennom et urinkateter som først føres inn i urinblæren. Blæren tømmes for eventuelt resturin før Ialuril settes inn, slik får du best konsentrasjon av virkestoffet i blæren. Kateteret fjernes etter at væsken er på plass. Du skal forsøke holde på løsningen i minst 30 minutter før du tisser den ut ved neste vannlating. Det er lurt å begrense drikke noe de siste timene før behandlingen.

Det er ingen kjente bivirkninger av preparatet og behandlingen tåles som regel godt.

Ved spørsmål kan du ringe poliklinikken.

Kontaktinformasjon

Navn på enhet: Kirurgisk poliklinikk Navn på behandlingssted: Bærum sykehus	Telefon direkte: 67 80 92 63 eller 67 80 98 02 Telefontid fra kl.08.30 til kl.15.00 www.vestreviken.no
--	---