

Surkling i øvre luftveier

Robinul ordineres initialt som behovsmedikasjon inntil x 6 /d.
Gi 0,2 mg sc inntil 1 x / time etter behov og inntil 1,2 mg
tilsvarende 6 doser / 24 timer. Bruk evt. sc sprøytepumpe.

For pasienter som, i tillegg til surklingen, puster anstrengt eller hurtig, og som ikke bruker morfinpreparater fra før av, kan det være aktuelt å forskrive en kombinasjon av morfin 2,5-5 mg sc og Robinul sc som angitt over.

Pasienten selv er vanligvis ikke plaget av sin surkling. Vurder sideleie.
Gi informasjon/forklaring til de pårørende.
Er væskebehandling seponert?
Bruk av sug frarådes!

Hvis symptomkontroll ikke oppnås, kontakt ditt lokale / regionale palliative team på dagtid, eller annen lege etter avtale.

Robinul®antikolinergikum (muskarineffekt) (surkling i luftveier ikke godkjent indikasjonsområde)

Effekt:	tørker ut slimhinnene
Relevante bivirkninger:	tørr og varm hud, ev. temperaturstigning, urinretensjon. Se Felleskatalogen.
Virkning inntre:	sc: etter 30-40 min, iv: etter 1 min
Tid til maksimal plasmakonsentrasjon:	iv: umiddelbart, po og sc: data mangler
Plasma T1/2:	1-1,5 timer
Virkningstid:	7 timer

Palliative Care Formularv 6th ed.