

ISBAR-dokumentasjon for MIT

Husk å dokumentere i pasientjournalen!

Dato: _____ / tlf.kl: _____ / responstid (fra tlf. til fremme på post): _____ / Tid brukt (min): _____

MIT-sykepleier: _____ / MIT-lege tilstede: Ja ☐ Nei ☐ / Navn: _____

Er postlege kontaktet? Ja ☐ Nei ☐ / Har postlege tilsett pasienten? Ja ☐ Nei ☐

NEWS2 (meldt): _____

Identitet: (Hvem ringer / fra hvilken avdeling?)

Pasientnavn:

Personnummer:

Situasjon: (Hvorfor ringer du?)

Bakgrunn:

Behandlingsbegrensninger:

Aktuell tilstand: (din vurdering av problemet)

Råd til videre behandling:

Vitale parametere

Kl:

Kl:

Kl:

A	Resp. frekvens			
	Skala 1*			
B	SpO ₂	Skala 2*		
	O ₂ tilførsel			
C	Blodtrykk			
	Puls			
	Diurese			
D	Blodsukker			
	Bevissthet			
E	Temperatur			
NEWS skår				

Behandlingsnivå:

*SpO₂ Skala 2 brukes kun ved hyperkapnisk respirasjonssvikt, verifisert ved blodgass ellers brukes Skala 1. Lege skal dokumentere i journal når Skala 2 skal brukes.

Sjekkliste:

MIT-notat i Dips ☐ / MetaVision (prosess) ☐ / NEWS2-skåring ☐

ABCDE - VURDERING AV PASIENTEN		Funn / tiltak:	Vurder tiltak som:
A I R W A Y S	L u f t v e i e r	- Frie luftveier - Snakker pasienten ubesværet - Lyder fra luftveiene?	- Hakeløft- eller kjeveløft - Suging i munnhule - Svelgtube/nesekantarell - Sideleie
B R E A T H I N G	P u s t	- Respirasjonsfrekvens - Respirasjonslyder - Hudfarge (sentral cyanose) - Rytme/dybde/symmetri - Bruk av hjelpemuskulatur - SpO2	- Høyt hodeleie - Oksygen - Blodgass - Assistert ventilasjon - Innhalasjoner
C I R C U L A T I O N	S i r k u l a s j o n	- Perifer og sentral puls - Blodtrykk - Kapillær fyllningsgrad - Hjerterefrekvens og hjerterytme - Hudtemperatur og -farge (perifer cyanose) - Diurese	- Heve ben / sjøkkleie - Legge perifert venekateter (PVK) - Væskestøt - Urinkateter / timediuress - EKG
D I S A B I L I T Y	B e v i s s t h e t	- Vurder bevissthet (ACVPU / GCS) - Pupiller - Blodsukker - FAST - tegn på hjerneslag (ansiktsskjevhet, parese i arm, språkvansker og hvor lang tid som har gått)	- Sideleie - Glucose (po/iv) - Antidot
E X P O S U R E	U n d e r s ø k e i s e	- Mål temperatur - Undersøk hele pasienten (sår, ødeme katetre etc.) - Smerter	- Tiltak avhenger av funn - Blodprøver